

тогава резултатите и на трите формули не се различават много.

Ние изтъкнахме по-горе, че нашата система от формули оперира все съ априорни величини. Априорен е коефициентът и на множествената корелация. Ако искаме да намеримът емпиричното, приближеното му значение, очевидно е, че ще бъде необходимо да заменимът всички априорни коефициенти на корелацията от типъ r_{ik} (от които съ образувани и коефициентът от типъ β въ [23]) съ приближените имъ значения, изчислени споредът формула [1] отъ първата част.

Ако искаме, както това постоянно се случва на практика, при прилагане метода на множествената корелация, да намеримът емпиричното приближение за \bar{X}_i , което на свой редът е само едно приближено значение на $X_i^{(0)}$, тръбва да заменимът вътър формула [34] отклоненията отъ математическите очаквания съ отклоненията отъ съответните аритметични сръдни. Ако означимът M_0 аритметичната сръдна на реда № 0, M_1 — на реда № 1 и, изобщо, M_j — на реда № j , а емпиричните приближения на коефициентът на регресията отъ типъ b_{ik} съ символъ b_{ik}' , получаваме, вместо формула [34], следната:

$$\bar{X}_i - M_0 = b_{01}' (X_i^{(1)} - M_1) + b_{02}' (X_i^{(2)} - M_2) + \dots + b_{on}' (X_i^{(n)} - M_n)$$

или

$$\begin{aligned} \bar{X}_i = & b_{01}' X_i^{(1)} + b_{02}' X_i^{(2)} + b_{03}' X_i^{(3)} + \dots + \\ & + b_{on}' X_i^{(n)} + [M_0 - b_{01}' M_1 - b_{02}' M_2 - \\ & - b_{03}' M_3 - \dots - b_{on}' M_n] \end{aligned} \quad [50]$$

Въз заключение, ще разгледаме два примера.

Първи пример. На стр. 267 и следните ние разгледахме единът прости случай, при който построението на редовете $X_i^{(0)}$, $X_i^{(1)}$ и $X_i^{(2)}$ е известно $a priori$. Ние имаме възможност, следователно, да изчислимът за него всички априорни коефициенти на корелацията. Намерихме, че връзката между $X_i^{(0)}$ и $X_i^{(1)}$ заедно съ $X_i^{(2)}$ се изразява чрезът формула [32].

Отъ последната формула излиза, че за реда № 0

$$\bar{X}_i = X_i^{(1)} + X_i^{(2)}$$

За да преценимът, доколко величината \bar{X}_i се приближава до истинската величина $X_i^{(0)}$ ние си служимът съ коефициента на множествената корелация r_{0-12} . Съгласно формула [42] получаваме

$$r_{0-12} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

Същата величина можемът да получимът, разира се, като корелираме непосредствено $(I+W)$ съ $(I+W+T)$.

За редът № 1 имаме отъ [33]

$$\bar{X}_i = \frac{1}{2} X_i^{(0)} - \frac{1}{2} X_i^{(2)}$$

Множественниятът коефициентъ на корелацията ни дава мърка за това, доколко новото

\bar{X}_i се доближава до $X_i^{(0)}$. Вътъи случай ние бихме получили

$$r_{1-02} = \sqrt{\frac{1}{2}}$$

По-малкото значение на r означава, че тукът имаме по-лошо приближение отъ това за реда № 0.

*Втори примерът**). Има известни основания да се предполага, че индекса на цените на едро вътъ България презъ времето отъ юлий 1924 год. до февруари 1930 год. се намираше подъ силното влияние на общото количество на парите циркулиращи вътъ страната презъ близките месеци, предшествуващи индекса. Ние можемът да напишемът, следователно, следното хипотетично равенство:

$$P_i = b_{01} M_{i-1} + b_{02} M_{i-2} + b_{03} M_{i-3} + \dots + E_i.$$

Тукът P_i (т. е. $X_i^{(0)}$) означава индекса презъ i -тия месецъ, освободенът отъ случайната и сезонната компонента; M_{i-1} (т. е. $X_i^{(1)}$) — количеството пари, циркулирали презъ предидущия, $(i-1)$ -ия месецъ; M_{i-2} (т. е. $X_i^{(2)}$) — количеството пари, циркулирали преди два месеца, т. е. презъ $(i-2)$ -ия месецъ и т. н. Количествата на парите съ, също така, по възможност, освободени отъ влиянието на случайната и сезонната компонента.

Ние ще се ограничимът да установимът връзката между P_i и трите предшествуващи месеца.

Коефициентът r' и β' получаватъ, при това, следните значения:

$$r'_{01} = +0.85, \beta'_{01-23} = +0.44, r'_{12} = +0.95$$

$$r'_{02} = +0.85, \beta'_{02-13} = +0.30, r'_{13} = +0.90$$

$$r'_{03} = +0.82, \beta'_{03-12} = +0.14, r'_{23} = +0.95$$

По формула [50] намираме:

$$\bar{P}_i = 0.261 M_{i-1} + 0.178 M_{i-2} + 0.083 M_{i-3} + 859.08$$

Пита се, какът ще се измѣри интензивността на връзката между изчисленото \bar{P}_i и фактически наблюдаваното P_i ? Интереса къмът така поставения въпросът се засилва съ това, че формулата за \bar{P}_i дава възможност за известна прогноза относно общото ниво на цените най-малко за единът месецъ напредъ. Отговорът на поставения въпросът се дава чрезъ изчислението на множествения коефициентъ на корелацията (вътъ нашия случай, на емпиричното му приближение), споредът формули [39] и [48], или пъкът на мърката H по формула [42].

Формула [39] дава $r'_{0-12} = +0.8620$,

формула [48] дава $r'_{0-12} = +0.8624$,

формула [42] дава $H' = +0.8629$

*). Този примерът е взетъ отъ цитираната наша статия: „Ist die Quantitätstheorie statistisch nachweisbar?“, където читателят може да намери всички подробности на изчислението, а също така и общата теория на случая.