

Възраст	1900	1926	мжже	жени
	q_x^m $q_x^ж$	q_x^m $q_x^ж$	q_x^{1926} q_x^{1900}	q_x^{1926} q_x^{1900}
51	0.9998	1.1443	0.8174	0.7142
52	1.0086	1.1604	0.8314	0.7226
53	1.0169	1.1748	0.8451	0.7315
54	1.0247	1.1874	0.8588	0.7411
55	1.0316	1.1977	0.8723	0.7513
56	1.0378	1.2061	0.8857	0.7621
57	1.0432	1.2122	0.8988	0.7735
58	1.0476	1.2162	0.9117	0.7853
59	1.0509	1.2177	0.9243	0.7977
60	1.0531	1.2169	0.9366	0.8105
61	1.0543	1.2138	0.9485	0.8238
62	1.0543	1.2085	0.9599	0.8375
63	1.0532	1.2010	0.9710	0.8515
64	1.0510	1.2031	0.9911	0.8658
65	1.0476	1.1802	0.9918	0.8803
66	1.0431	1.1672	1.0016	0.8950
67	1.0375	1.1526	1.0108	0.9098
68	1.0310	1.1535	1.0196	0.9113
69	1.0235	1.1238	1.0279	0.9362
70	1.0152	1.1015	1.0358	0.9547
71	1.0061	1.0847	1.0453	0.9696
72	0.9963	1.0629	1.0501	0.9844
73	0.9939	0.9983	1.0947	1.0899
74	0.9889	0.9694	1.0389	1.1618
75	0.9820	0.9632	1.1826	1.2056
76	0.9738	0.9730	1.2261	1.2271
77	0.9651	0.9921	1.2661	1.2317
78	0.9563	0.9933	1.2717	1.2244
79	0.9478	0.9998	1.2757	1.2094
80	0.9273	1.0099	1.2962	1.1901
81	0.9326	1.0221	1.2819	1.1697
82	0.9264	1.0351	1.2854	1.1504
83	0.9213	1.0478	1.2898	1.1341
84	0.9173	1.0589	1.2955	1.1222
85	0.9096	1.0676	1.3098	1.1159
86	0.9129	1.0729	1.3118	1.1161
87	0.9126	1.0745	1.3228	1.1235
88	0.9134	1.0719	1.3361	1.1385
89	0.9155	1.0651	1.3514	1.1616
90	0.9188	1.0654	1.3835	1.1931
91	0.9233	1.0396	1.3887	1.2334
92	0.9291	1.0217	1.4106	1.2827
93	0.9361	1.0013	1.4346	1.3412
94	0.9443	0.9789	1.4609	1.4093
95	0.9538	0.9550	1.4891	1.4872
96	0.9533	0.9304	1.5373	1.5752
97	0.9764	0.9053	1.5518	1.6737
98	0.9780	0.9113	1.5070	1.6172
99	0.9795	0.9174	1.4635	1.5626
100	0.9811	0.9235	1.4213	1.5099

Отъ колона първа на горната таблица се вижда, че към 1900 година при възраститѣ отъ 0—8 години, смъртността на момчетата е по-голяма (съ изключение на възраститѣ 2 и 4 години) отъ смъртността на момичетата, като за 0 годишна възраст, разликата е най-голяма. Отъ 9 годишна възраст до 51 годишна възраст смъртността на женитѣ е по-голяма отъ тази на мъжетѣ. Изключение правятъ 19 и 20 годишната възраст, презъ които смъртността на мъжетѣ надвишава тази на женитѣ. Разликата между смъртността на мъжетѣ и тази на женитѣ следъ 9 годишна възраст се увеличава постепенно и е максимална въ възраститѣ между 21 и 25 години. Навѣрно тази голяма разлика е въ връзка съ встъпването въ бракъ и първитѣ раждания. Следъ тази възраст разликата постепенно намалява, но смъртността на женитѣ е все чувствително по-голяма отъ тази на мъжетѣ. Отъ 52 годишна възраст нагоре мъжетѣ уми-

ратъ повече отъ женитѣ. Това продължава до 71 годишна възраст, следъ което смъртността на женитѣ става пакъ по-голяма и това продължава до крайната възраст.

Презъ периода 1925—1928 година съотношението между смъртността на мъжетѣ и женитѣ се промѣня. Смъртността на мъжетѣ е по-голяма само презъ първата година следъ раждането. Къмъ края на първата година тя се изравнява съ смъртността на женитѣ и следъ тази възраст — до 43 годишна възраст, тя остава все по-малка отъ нея. Особено чувствителна става разликата за възраститѣ отъ 23 до 34 годишна, следъ което разликата постепенно намалява.

Отъ 44 годишна възраст до 72 годишна възраст, смъртността у мъжетѣ става пакъ по-голяма, както и отъ 80 години нагоре.

Презъ периода 1900—1926 год. смъртността на женитѣ се е увеличила по отношение смъртността на мъжетѣ за възраститѣ отъ 1 до 13 години, а се е намалила за възраститѣ надъ 40 години. Въ колона 3 и 4 на таблица 40 сж дадени отношенията на въроятноститѣ за умирање около 1926 год., къмъ въроятността за умирање около 1900 год. по възрасти и за всѣки полъ по отдѣлно. Тѣзи отношения сж единични индексни числа, които показватъ каква е въроятността за умирање къмъ 1926 година, ако вземемъ за единица въроятността за умирање къмъ 1900 година.

Отъ първитѣ числа на тѣзи две колони виждаме, че смъртността между новороденитѣ деца къмъ 1926 година се е увеличила въ сравнение съ смъртността имъ къмъ 1900 година. Като се има предвидъ, че презъ този 26 годишенъ периодъ медицинската помощъ се е значително разширила и общитѣ хигиенични условия сж се подобрили, не може да се приеме, че смъртността при новороденитѣ действително се е увеличила. Причината за това увеличение на смъртността, която ни даватъ даннитѣ, трѣбва да се дължи въ голѣма степенъ на нееднаквата пълнота на статистическитѣ данни за смъртнитѣ случаи между децата отъ 0 до 1 годишна възраст.

Има случаи въ селата, особено въ миналото, когато децата, умрѣли наскоро следъ раждането, не сж били регистрирани по надлежния редъ. Това е ставало по-често въ сѣлствнитѣ общини, или въ отдалеченитѣ отъ общинитѣ селища. Съ течение на времето, регистрирането на умирањията на новороденитѣ въ селата е ставало все по-точно и обхващало всички смъртни случаи. Съ това се обяснява и факта, че като се сравнятъ коефициентитѣ за смъртността¹⁾ на децата отъ 0 до 1 годишна възраст за периода 1899—1928 год., въ граדותѣ смъртността между децата на възраст отъ 0 до 1 година е по-голяма отъ колкото въ селата. Но презъ последнитѣ години смъртността между децата отъ 0 до 1 година въ граדותѣ е по-малка

¹⁾ Статистически годишникъ на Царство България — 1933, стр. 82.