

КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ОБЩА И ДЕТСКА СМЪРТНОСТ ПО ПОЛ НА НАСЕЛЕНИЕТО
НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1985-1993 ГОДИНА

(‰)

Групи	Години									
	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	
Обща смъртност										
Общо	12,00	11,60	11,94	12,10	12,26	12,46	12,79	12,65	12,93	
Мъже	13,38	12,96	13,34	13,50	13,72	14,07	14,28	14,35	14,61	
Жени	10,64	10,26	10,57	10,73	10,84	11,14	11,62	11,20	11,14	
Детска смъртност										
Общо	15,40	14,66	14,70	13,58	14,37	14,76	16,93	15,93	15,52	
Момчета (М)	16,77	16,72	15,88	15,59	16,29	18,64	19,11	17,54	17,78	
Момичета (Ж)	13,94	12,50	13,46	11,45	12,36	11,944	14,61	14,22	13,13	
Отношение М/Ж	1,20	1,34	1,18	1,36	1,32	1,56	1,31	1,23	1,35	

Анализът на детската смъртност по пол разкрива сравнително малко намаление в стойностите на коефициента за детска смъртност на момчетата от 1985 до 1988 година. Намалението се реализира чрез редуване на повишения и снижени на смъртността. За момичетата също се установява последователност от повишения и намаления. Максимумът от 14,61 ‰ е достигнат през 1991 г., както и при момчетата - 19,11 ‰. За следващите две години, 1992 и 1993, стойностите на коефициента намаляват. Намалението на смъртността при момичетата през 1993 г. обуславя и по-ниската стойност на общия коефициент за детска смъртност за същата година. Характерната свръхсмъртност на момчетата в сравнение с момичетата ясно се проявява, което се вижда и от стойностите на отношението, поместени в табл. 1.

Вариацията на стойностите на смъртността във връзка с нарастването на възрастта може да се види в табл. 2. Смъртността в интервала 1-9 г. има по-висока стойност от тази в следващия интервал (10-19 г.), което е резултат от по-високото равнище на смъртността през първите няколко години от живота. Интервалът 10-19 г. се характеризира с най-ниско равнище на смъртност. В следващите два възрастови интервала (20-29 и 30-39 г.) коефициентът за смъртност преминава