

редуване на стойностите 1,7 и 1,8 до 1992 година. За 1993 г. има нарастване на 2,0, т.е. скок от 0,3 пункта. Зад това се крие снижението на смъртността на мъжете на възраст 20,29 г. от една страна, и повишиението на смъртността за възраст 30-39 години.

Втората особеност, която заслужава внимание, се отнася за по-високите стойности на отношението за възрастите 40-49 и 50-59 години. Те са от порядъка на 2,3-2,4, и с някои изключения, 2,5 и 2,6. Тези стойности се запазват през целия период 1985-1993 година. Очевидно това са възрастите, при които нарастването на смъртността е по-силно. В сравнение с тях следващият възрастов интервал 60-69 г. може да се характеризира като „по-спокоен“. При него нарастването на смъртността спрямо равнището в интервала 50-59 г. се колебае в границите между 2,0 за 1993 и 2,3 за 1991 година. Следва интервалът 70-79 г., за който са типични максимални стойности на отношението и където през 1985 г. то приема стойност 2,7, а през следващите две години (1986 и 1987) съответно 2,8 и постепенно намалява до 2,1 през 1991 година. Това е интервалът, за който се установява тенденция на снижаване стойностите на отношението, което е признак за доближаване равнищата на смъртност в интервалите 60-69 и 70-79 години. Обратно, за наличието на тенденция на нарастване на различието свидетелстват стойностите на отношението за интервала 80-89 години. От 2,2 за 1985 г. след намаление с 0,1 пункта през 1986-1988 г. следва нарастване до 2,4, равнище, което се задържа до края на периода. Независимо от колебанията, които се установяват в стойностите на отношението за възрастовия интервал 90+г., типичното за тяхната динамика е очертаващото се намаление. Очевидно и тук се проявява тенденция на сближаване равнището на смъртност за двата интервала, което е по-добре изразено за годините 1991 - 1993.

Първата особеност в равнището на смъртност на жените е, че стойността на коефициента е под единица до навършване на възраст 30 години. За възрастовия интервал 1-9 г. стойностите варират в границите от 0,52% през 1986 до 0,63% през 1992 г. (табл.4). Размахът е 0,11 пункта. В следващия интервал, 10-19 г., картина е същата както при предходния. Аналогична е ситуацията и при интервала 20-29 години. Най-ниското равнище (0,55%) е достигнато през две от годините - 1989 и 1991, а максимумът (0,62%) е регистриран през 1988 г., което означава, че размахът е само 0,07 пункта. Данните не дават основания да се приеме, че в равнището на смъртността на жените на възраст 1-29 г. е настъпила промяна за периода 1985 - 1993 г.