

на периода (1993 г.) коефициентът има малко по-ниски стойности от тези в началото на периода (1985 г.), нямаме основания да считаме, че това е трайна тенденция на намаление.

За интервала 60-69 размахът е 3,14 пункта, чувствително по-голям от този за предходните интервали, и е получен като разлика между стойностите за 1986 г. 14,35% - минимум, и за 1991 г. 17,49 - максимум. За целия период от 1985 до 1993 г. има слабо увеличение от 0,90 пункта, подготвено от годините преди 1991, когато е достигнат максимумът.

Равнището на смъртност при жените на възраст 70-79 г. намалява с 11,55 пункта за времето от 1985 до 1993 година. При жените на възраст 80-89 г. също има снижение, но то не е така плавно, както при предходния интервал. По-скоро се осъществява с колебания, с малки скокове в двете посоки. Подобно намаление на смъртността има и при интервала 90+ г. След преминаване на един своеобразен максимум от 376,21% през 1986 г., през следващите 2 години коефициентът се задържа на ниво почти 349%, следва спад на 329,84%, скок на 344,50%, и отново спад.

Както при общия повъзрастов коефициент, и при мъжете, и при жените отношенията показват нарастване на стойностите на коефициента за смъртност в почти геометрична прогресия. Това важи с най-голяма сила за възрастите над 40 години. Изключение прави интервалът 70-79 г., за който през 1985 г. относителната величина е 3,7 и по-трудно се вписва сред останалите, вариращи между 2,3 (40-49 г.) и 2,6 (80-89 г.) С течение на времето се наблюдават разнопосочни изменения в размера на отношението. За интервалите 20-69 г. почти няма промени. Стойностите варират в сравнително тесни интервали - между 0,3 и 0,5 пункта. При интервала 70-79 г. има тенденция на намаление в стойностите на отношението. От 3,7 през 1985 г. то нараства на 3,9 през 1986 и 1987 г., след което започва да намалява до 2,8 през 1993 година. Това е следствие преди всичко от понижената смъртност през 1992 и 1993 г. на жените от възрастовия интервал 70-79 г. и запазващото се почти еднакво равнище за възраст 60-69 години.

Тенденция на слабо повишение бележат отношенията за интервала 80-89 години. От 2,6 за 1985 г. след слаби колебания е налице нарастване, което достига до 3,0 за 1993 година. Оказва се, че, независимо от тенденцията на намаляваща смъртност в интервалите 70-79 и 80-89 г., темпът на намалението в първия е по-голям, което има за резултат нарастване на отношението. За последния интервал, 90+ г., може да се каже, че стойностите общо взето намаляват, но това става чрез непрекъснати колебания.