

Определено място в анализа имат и сравненията между мъжете и жените. Първата особеност е свързана с известната свърхсмъртност на мъжете. За всички години на изследвания период коефициентите за смъртност на мъжете имат по-високи стойности от тези на жените.

За първите четири възрастови интервала (1-9, 10-19, 20-29 и 30-39 г.) стойностите на коефициента за смъртност и за двата пола се променят почти по еднакъв начин. Това важи както за периода до 1989, така и за 1990-1993 година.

Първото различие между двата пола е свързано с интервала 40-49 г. През годините от 1985 до 1988 включително смъртността при мъжете намалява, а от 1989 нараства след известно колебание. При жените равнището е почти постоянно през 1990, 1991 и 1992 и леко намалява през 1993 г. на 2,23%.

За интервала 50-59 г. се наблюдават противоположни изменения в равнището на смъртност на мъжете и жените не само през подпериодите, но и през целия изследван период. При мъжете независимо от колебанията смъртността нараства, а при жените намалява.

Картината се променя в известна степен при възраст 60-69 години. През периода 1985 - 1991 г. смъртността и за мъжете, и за жените се повишава с малки колебания, докато достигне своя максимум. След 1991 г. при мъжете се установява намаление през 1992 и повишение през 1993, а при жените то продължава и през 1993 година. Факт е, че при двата пола равнището на смъртността в края на периода (1993 г.) е по-високо от това в началото (1985 г.). Налага се изводът, че при мъжете и жените на тази възраст (60-69 г.) се наблюдава тенденция на повишаване на смъртността през изследвания период.

Начинът, по който се изменят стойностите на показателя за смъртност в интервала 70-79 г., е еднакъв при мъжете и жените. Различието е за 1990 г., когато смъртността при мъжете се повишава само с 0,2 пункта, а при жените има намаление с 1,81 пункта. Общи са годините, когато се достига максимално равнище на смъртност - 1987, и минимално - 1993 година. В резултат на добре изразената тенденция на намаление на смъртността при мъжете стойността на коефициента намалява от 78,78% през 1985 г. на 66,86% през 1993 г., т.е. разликата е 11,92 пункта. При жените снижението е съответно от 56,79 на 42,24%, или разликата е 14,55 пункта.

За предпоследния интервал, 80-89 г., се установяват незначителни различия между изменението на смъртността при мъжете и жените. При мъжете още през първите две години (1985 и 1986) се достигат максимумът и минимумът. При жените