

процентни пункта за мъжете и 0,89 пункта за жените. Това може да се приеме като сигнал за евентуални отрицателни промени в равнището на смъртността в близко бъдеще.

3. Установява се определено снижение на детската смъртност след 1991 г., но въпреки това тя се запазва малко по-висока през 1993 в сравнение с 1985 година.

4. Налице е стабилност във времето в стойностите на коефициентите за смъртност на мъжете и жените на възраст 1-29 години. Може да се каже, че социално-икономическите промени почти не са се отразили върху равнището на смъртност за тези възрастови групи.

5. Добре изразената тенденция на нарастване на смъртността при мъжете на възраст 30-60 г., особено след 1988 г., е признак за наличие на фактори, обуславящи по-високо равнище на смъртност сред тази група за целия изследван период. За разлика от мъжете, при жените липсата на някакви съществени промени в равнището на смъртността за възрастите от 30 до 60 г. може би е най-важната особеност.

6. На основата на резултатите от проведеня анализ може да се направи изводът, че има изменения в повъзрастовата смъртност на нашето население през годините 1989-1993. Трябва да се има предвид, че промените в смъртността са преди всичко в по-високите възрастови интервали (над 30 и в по-голяма степен над 40 г.).

Приета за печат на 28.09.1995 г.