


■ При децата на възраст от 5 до 14 г. в разликата преобладават травмите и отравянията (клас XVII) и новообразуванията (клас II).

■ В юношеската, младежката и младата зряла възраст на челните места са травмите и отравянията. Във всяка следваща възрастова група нараства дялът на болестите на органите на кръвообращението (клас VII) и на болестите на храносмилателната система (клас IX).

■ След 45-годишната възраст разликата вече се определя от болестите на органите на кръвообращението; относителният им дял достига първи екстремум във възрастта 65-69 години и втори - след 85 години. Дялът на новообразуванията се стабилизира след 55-годишната възраст на около 20%. След 70-годишната възраст нарастват ясно относителните дялове на пневмониите и на травмите и отравянията.

Нозологичната характеристика на мъжката свръхсмъртност се допълва от някои данни за измененията на съотношенията между вероятностите за умиране



Фиг. 3. Повъзрастови индекси на свръхсмъртността в България за периодите 1986-1989 и 1990-1994 година

през периода 1986-1994 г. според таблиците за смъртност за периодите 1986-1989 и 1990-1994 г.

Преди всичко трябва да се подчертае, че в почти всички възрастови групи смъртността при мъжкия пол си остава по-висока, т. е. мъжката свръхсмъртност е налице (фиг. 3). Известно намаление на размера ѝ се регистрира при децата до