



Фиг. 4. Повъзрастови индекси на свръхсмъртността през периода 1986-1989 г. по главни класове причини за умиране

14 години. Но във възрастовия диапазон от 15 до 59 години тя е продължила да нараства с екстремуми над 2,5 пъти във възрастовите групи 20-24 и 40-44 години.

Разгледана по възраст и класове болести, еволюцията на мъжката свръхсмъртност между 1986-1989 и 1990-1994 г. (фиг. 4 и фиг. 5) показва някои интересни особености:

- Свръхсмъртността на мъжете от новообразувания в сравнение с останалите причини е нараснала относително слабо. Нарастването ѝ е най-голямо при децата на 5-9 години и младежите на 25-29 години. Между 30 и 39 години смъртността на жените от новообразувания е по-висока от тази на мъжете.

- През разглеждания период свръхсмъртността на мъжете у нас от болести на органите на кръвообращението не се е променила съществено. През периода 1990-1994 г. обаче се е появил нов екстремум във възрастта 15-19 години. Между 5 и 9 години е налице женска свръхсмъртност, а във възрастта 80 и повече години смъртността на жените от този клас болести се изравнява с тази на мъжете.

- Мъжката свръхсмъртност от болести на дихателната система обхваща все по-широк възрастов диапазон. Докато през 1986-1989 г. максимумът е бил във