

При изчисление голѣмината на извадката ние, както казахме, сме изхождали отъ предположението, относителната грѣшка δ за $\frac{m}{n} = \frac{1}{50}$ да не е по-голѣма отъ $\pm 50\%$. Да видимъ сега, при така изчислената извадка, какви значения ще приеме δ за по-голѣми честоти $\frac{m}{n}$.

За да бждемъ конкретни, ще предположимъ, че $N = 6,000$ (което отговаря на една извадка $\frac{N}{n} = \frac{1}{8}$), а $\frac{m}{n} = \frac{1}{10}$ ($= 10\%$). Формула (4) при $N = 6,000$; $k = \frac{3}{2}$; $\frac{n}{N} = \frac{1}{8}$; $\frac{m}{n} = \frac{1}{10}$ дава $\delta = 0,217$ или $21,7\%$. Следователно, истинската честота се намира нѣкъде между ($10\% - 21,7\%$) и ($10\% + 21,7\%$) — напълно допустимъ резултатъ. Ако приемемъ $\frac{m_i}{n} = 20\%$, намираме по аналогиченъ начинъ $\delta = 0,145$. А при $\frac{m}{n} = 40\%$, $\delta = 0,089$ и т. н. Все напълно удовлетелни резултати. Отъ друга страна, при $\frac{m}{n}$ по-малко отъ 2% ще получимъ по голѣми δ отъ предположената. Напримѣръ, за $\frac{m}{n} = \frac{1}{100}$, $\delta = 0,721$.

Понеже за различнитѣ околии сж правени различни извадки, а нѣкои околии сж работени даже изчерпателно, получаването на общи срѣдни и проценти за цѣлия окръгъ е свързано съ известни усложнения. Тѣзи усложнения сж разрешени чрезъ следнитѣ разсждения.

Нека даденъ окръгъ се състои отъ K околии; броятъ на земеделскитѣ стопанства въ окръга е N , а въ отдѣлнитѣ околии $N_1, N_2, N_3 \dots N_k$, така че $N = N_1 + N_2 + N_3 + \dots + N_k$. Отъ тѣзи числа сж попаднали въ извадкитѣ $n_1, n_2, n_3 \dots n_k$.

Въ основната маса N има една часть M съ даденъ признакъ, разпредѣлена по околии съответно $M_1, M_2, M_3 \dots M_k$, така че $M = M_1 + M_2 + M_3 + \dots + M_k$. Отъ тѣзи числа фактически сж попаднали въ извадкитѣ: $m_1, m_2, m_3 \dots m_k$.

Величинитѣ $m_1, m_2, m_3 \dots$; $n_1, n_2, n_3 \dots$ и всичкитѣ N_i сж известни. Търси се значението на дробта $\frac{M}{N}$.

Имаме тождество: $M_i = m_i \cdot \frac{M_1}{m_1}$. Споредъ законъ за голѣмитѣ числа, $\frac{M_1}{m_1}$ е приблизително равно на $\frac{N_1}{n_1}$ и ние можемъ приближено да пишемъ:

$$M_i = m_i \cdot \frac{N_i}{n_i} = \frac{m_i}{n_i} \cdot N_i. \text{ А отъ тукъ}$$

$$\frac{M}{N} = \frac{M_1 + M_2 + \dots + M_k}{N_1 + N_2 + \dots + N_k} =$$

$$\frac{m_1 \frac{N_1}{n_1} + m_2 \frac{N_2}{n_2} + \dots + m_k \frac{N_k}{n_k}}{n_1 \frac{N_1}{n_1} + n_2 \frac{N_2}{n_2} + \dots + n_k \frac{N_k}{n_k}}$$

или

$$(7) \dots \frac{M}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{i=k} m_i \frac{N_i}{n_i} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{i=k} \frac{m_i}{n_i} N_i$$

Аналогично, като означимъ аритметичното срѣдно за извадката отъ i -та околия чрезъ $x_{(i)}$, а за окръга чрезъ $x_{(n)}$, можемъ да пишемъ приблизително:

$$(8) \dots x_{(n)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{i=k} x_{(i)} N_i$$

Отъ горнитѣ формули виждаме, че срѣднитѣ и относителнитѣ числа за окръжитѣ представляватъ претеглени срѣдни отъ съответнитѣ данни за околинитѣ. Като тегла служатъ количествата на картитѣ въ околинитѣ. Разбира се, формулитѣ (7) и (8) сж само приблизителни.

Тѣхнитѣ стандартни отклонения се даватъ отъ следната формула:

$$(9) \dots \sigma = \frac{1}{N} \sqrt{N_1^2 \sigma_1^2 + N_2^2 \sigma_2^2 + N_3^2 \sigma_3^2 + \dots + N_k^2 \sigma_k^2} =$$

$$= \frac{1}{N} \sqrt{\sum_{i=1}^{i=k} N_i^2 \sigma_i^2} \quad *)$$

За да опредѣлимъ стандартното отклонение на полученото по формула (7) приблизително значение на величината $\frac{M}{N}$ нужно е въ формула (9) да замѣнимъ σ_i^2 съ величината

$$(10) \dots \frac{m_i}{n_i} \left(\frac{1 - \frac{m_i}{n_i}}{n_i} \right), \text{ която се отличава отъ}$$

$$\frac{N_i - 1}{N_i \cdot N_i - n_i}$$

формула (1) само по отсѣтствието въ нея на знака за радикала и на двойката въ числителя. А за да получимъ отъ (9) стандартното отклонение за срѣдната $x_{(n)}$ (гл. формула 8), нужно е въ формула (9) да замѣнимъ σ_i^2 съ

$$(11) \dots \frac{\mu_i^{(2)}}{n_i \cdot N_i - n_i}, \text{ кждето } \mu_i^{(2)} = \sum_{i=1}^{i=n_i} \frac{(x_i - x_{(n)})^2}{n_i - 1}$$

(гл. форм. 2 и 3), т. е. е равно на квадрата отъ стандартното отклонение за i -та околия.

За да изчислимъ модулитѣ на величинитѣ $\frac{M}{N}$ и $x_{(n)}$ необходимо е да помножимъ на $\sqrt{2}$ дветѣ части отъ равенство (9).

Формула (9) показва, колко модулитѣ на величинитѣ (7) и (8) за окръга е по-малкъ отъ модуля за отдѣлнитѣ околии, които го съставятъ. Наистина, ако предположимъ, че

*) Въ нашия случай извадкитѣ и честотитѣ по отдѣлни околии сж взаимно свършено независими, затова, както е известно отъ теорията, стандартното отклонение на тѣхната сума ще е равно на сумата отъ квадратитѣ отъ стандартнитѣ отклонения на отдѣлнитѣ слагаеми. Не е трудно да се съобрази, че, при това, теглата на последнитѣ също ще се повдигнатъ въ квадратъ.