

За да се избъгнат подобни гръшки, изваждането на карти се произвеждаше по следния начин. Преди всичко се провѣряваше дали картитѣ не сж разположени въ нѣкакъв специфичен порядъкъ, благодарение на който попадащите въ извадката карти да притежаватъ нѣкои общи за тѣхъ свойства, които да не се срѣщатъ въ такава степенъ въ останалитѣ; следъ това започва отдѣлянето на извадката на всѣка п-та карта отгоре надолу въ тоя редъ, въ който картитѣ сж подредени. Когато се привърши една връзка карти, следната се счита като нейно непосредствено продължение.

Когато изтегляването се извършваше отъ нѣколко челоуѣка едновременно, то първиятъ започваше първата си връзка съ изтегляне първата карта, вториятъ съ итегляне на втората, третиятъ на третата и т. н. Строго се наблюдаваше, щото да бжде изтеглена именно оная карта, която се явява по реда си. Ще бжде ли тя дефектна, непълна, мръсна, изключителна въ известна насока — това е безразлично*).

По третия въпрос. Какъ се организира сводката на изтегления материалъ? Отговорътъ е извървредно простъ: сводката се произведе абсолютно така, както всѣка сводка на изчерпателно наблюдение, при това съ точностъ и безъ съкращение по ония таблични форми, които бѣха утвърдени отъ В. С. С., съ изключение на № 1, № 9 и № 11 (гл. по-горе стр. 123). Въ противенъ случай бихме били лишени отъ възможността да изчислимъ стандартното отклонение за ония колони, за които даваме и срѣдни аритметични. А безъ знанието на стандартното отклонение би било невъзможно опредѣлянето предѣлитѣ на грѣшката на тия срѣдни въз основа на формула (2).

Преминаваме къмъ четвъртия въпросъ: окончателния видъ на своднитѣ таблици. Освенъ въпросътъ за съкратяването въ вертикално и хоризонтално направление на окойскитѣ таблици, за което говорихме на стр. 123, тукъ трѣбваше да се вземе решение и по въпроса за замѣна на абсолютнитѣ числа съ относителни такива. Работата е тамъ, че, както казахме по-горе (вижъ стр. 117), репрезентативниятъ методъ на статистическитѣ наблюдения ни дава обикновено само относителни числа и срѣдни величини: опредѣляйки, напр., чрезъ този методъ срѣдното производство на единъ хектаръ пшеница, ние не можемъ да изчислимъ общото производство на пшеницата въ България, ако не знаемъ точно цѣлата

площ, засѣта съ това растение. Следъ като опредѣли честотата на бѣлитѣ тѣлца въ кръвта на пациента, взета за изследване, имѣкарътъ не може още да изчисли общото имъ количество у пациента, ако не знае теглото на цѣлата му кръвъ и т. н. Обаче, ако, както е въ нашия случай, чрезъ едно изчерпателно наблюдение предварително е установенъ общиятъ брой на земеделскитѣ стопанства въ всѣка околия и заетата отъ тѣхъ земелна площ, тогава става възможно едно *приближително* опредѣляне на известни абсолютни количества, характеризиращи *цѣлата* маса. Така, напр., ако при извадка $\frac{1}{8}$ броятъ на стопанствата отъ 0 до

10 декари въ извадката е 125, общото имъ количество въ околията ще бжде приблизително 8 пѣти повече, т. е. $125 \times 8 = 1000$. Това именно и подобно на него приблизителни числа ще наричаме *претеглени*, за разлика отъ съответнитѣ абсолютни числа, които се явяватъ като резултатъ на изчерпателната сводка. (Гл. таблицитѣ на стр. 241—255). Ние казваме *приближително*, понеже, първо, като замѣнимъ въ тождеството $M_i = m_i \frac{M_i}{m_i}$ (гл. стр.

125) величината $\frac{M_i}{m_i}$ чрезъ $\frac{N_i}{n_i}$, ние вкарваме известна грѣшка, размѣра на която се опредѣля по формулитѣ на „закона за голѣмитѣ числа“; второ, извадката у насъ е винаги цѣло число, (като вадимъ, напр. 3^2 , 5^4 или 10^2 и т. н. карта), когато $\frac{N_i}{n_i}$ може да е и несъкратима дробъ.

Нека, напр., $N_i = 1001$ и ние вадимъ всѣка 8-ма карта, начинающа отъ първата. Тогава $n_i = 126$ и $\frac{N_i}{n_i} = 7.936$, а не точно 8. Обаче тази последна грѣшка при щого-годе значително N е толкова малка, че спокójно може да се пренебрегне. Модультъ на величината $m_i \frac{N_i}{n_i} = \frac{m_i}{n_i} \cdot N_i$, която ние приемаме приблизително равна на величината M_i , се опредѣля, за случая бжде възвръщане на топката или билета, по следната формула:

$$(12) \dots \sqrt{\frac{2 \frac{m_i}{n_i} (1 - \frac{m_i}{n_i}) (N_i - n_i) N_i}{N_i - 1} \cdot \frac{N_i}{n_i}}$$

която се получава отъ формула (1) чрезъ поставянето на индекситѣ (i) и умножението съ N_i . Отъ тукъ не е мѣжно да се заключи, че *относителната* грѣшка δ за величината M_i е съвсемъ сжщата, както и за величината $\frac{m_i}{n_i}$. Ако възможнитѣ предѣли на относителната грѣшка за $\frac{m_i}{n_i} = \frac{1}{50}$ сж $\pm \frac{1}{2}$, то сжщитѣ предѣли се запазватъ и за величината $\frac{m_i}{n_i} \cdot N_i$. Нека последната величина се е оказала равна на 100; тогава истинското значение на M_i ще е нѣкъде между (100—50) и (100+50), т. е. между 50 и 150. Подобни колебания на абсолютнитѣ числа

*) Описаниятъ начинъ, ако първичниятъ материалъ е нареденъ по териториаленъ признакъ, отговаря собствено на случая, който Боули въ своя меморандумъ нарича „stratified sample“, и модультъ за него се изчислява по формула, аналогична на нашата формула (9), т. е. той се получава още по-малкъ, отколкото е дадениятъ у насъ съ формули (1) и (2). Обикновено, обаче, изгодата отъ такова изчисление не оправдава положението *дълготелно* трудъ, понеже би трѣбвало сводката да се извършва по общини.