

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

262

ПРОФ. О. Н. АНДЕРСОН

ще фигурират сръдно-аритметичните на априорните стандартни отклонения на отдельните членове. Нашето изискване за хомогенност на редовете е в интереса на логиката, а не на математическата техника!

Не би било рационално да замествамъм направо величините, влизащи във формула [6], на стр. 258, със математически очаквания. Работата е тамъ, че ние тогава получаваме максимално възможното значение +1 във всички случаи, когато математическият очаквання на величините ϵ и ϵ' са равни на нула, макар, при това, всичките отдельни ϵ_i или ϵ'_i да са много големи и да засенчват величините ξ и ϕ .

Най-простата априорна характеристика на реда, държаща съмтъка за промънливостта му, е, както е известно, стандартното отклонение σ . Нека априорното стандартно отклонение на реда ξ е σ_ξ , на реда $\phi - \phi'$, на реда $\epsilon - \epsilon'$, на реда $\epsilon - \sigma_\epsilon$, на реда $X - \sigma_x$ и на реда $Y - \sigma_y$. Тогава, изхождайки от типа на формула [6], идваме до следната формула за измърване интензивността на връзката между X и Y :

$$H = \frac{\sigma_\xi}{\sigma_x} \cdot \frac{\sigma_\phi}{\sigma_y} \quad [10].$$

Означавайки сега $q_1 = \frac{\sigma_\xi}{\sigma_x}$ и $q_2 = \frac{\sigma_\phi}{\sigma_y}$ [11], получаваме окончателно $H = q_1 q_2$ [12].

Обръщаме особено внимание на читателя че мърката H мъри само промънливостта, т. е. кодебанията на редовете X и Y . Абсолютните значения на тия последните не играят при това никаква роля. Така, напримър, величината H не се промъня, ако ние умножаваме всички членове на реда X (или реда Y , или и на двата едновременно) съ една и съща величина A , голема или малка, положителна или отрицателна, цяла или дробна — безразлично. Също така H не се промъня и когато ние добавяме към всичките членове на реда X (или реда Y , или и на двата реда едновременно) една и съща величина B , положителна или отрицателна. Казаното е въ сила и по отношение на емпиричния коефициент на корелацията [1] и на това му свойство съ базирани редица опростени приами за неговото изчисление.

При възприетата от нас взаимна независимост между величините ϵ и ξ , ϵ и ϕ може лесно да се докаже, че $\sigma_x^2 = \sigma_\xi^2 + \sigma_\epsilon^2$; $\sigma_y^2 = \sigma_\phi^2 + \sigma_\epsilon^2$ и ние можемъ да напишемъ:

$$q_1 = \sqrt{\frac{\sigma_x^2 - \sigma_\epsilon^2}{\sigma_x^2}} = \sqrt{1 - \frac{\sigma_\epsilon^2}{\sigma_x^2}};$$

$$q_2 = \sqrt{\frac{\sigma_y^2 - \sigma_\epsilon^2}{\sigma_y^2}} = \sqrt{1 - \frac{\sigma_\epsilon^2}{\sigma_y^2}} \quad [13]$$

Ако компонентата ϵ изобщо липсва във реда X , тогава $\sigma_\epsilon = \sigma_x$ и $q_1 = 1$ и, следователно, $H = \frac{\sigma_\phi}{\sigma_y} = q_2$. Ако пък компонентата ϵ липсва,

тогава $\sigma_\epsilon = \sigma_y$ и $H = \frac{\sigma_\xi}{\sigma_x} = q_1$.

Ако липсват и ϵ , и ϵ' , тогава $H = 1$.

Ако компонентите ξ и ϕ липсват, тогава $H = 0$.

Мърката H е априорна във този смисъл, който ние дадохме на този термин по-горе и затова се явява въпроса какъв да се намери нейното емпирично приближение, или, както казва Чупровъ, „презумтивна величина“. Като такава ние ще съмѣтаме оная функция на членовете отъ двата реда X и Y , математическото очакване на която (или, най-малко, предъдъла, къмъ който се стреми математическото очакване при увеличението на N) дава величината H .

Може да се докаже (гледай приложението къмъ настоящата статия), че за известно емпирично приближение на H може да служи произведението на двете „корелационни отношения“ (correlation ratio) на Карль Пирсонъ:

$$\tau'_{x/y}, \tau'_{y/x} *$$

За жалост, тези величини почти не могат да се прилагат къмъ редовете, които се промънят въ временно отношение (т. е. къмъ большинството на статистич. редове, съ които борави икономистът), понеже дават почти винаги максималното си значение +1 за тъхъ. Затова, ние можемъ тукъ да ги оставимъ безъ разглеждане.

Ако, обаче, нашето изследване по единъ или другъ пътъ ни довежда до извода, че функцията, изразяваща причинната връзка между елементите ξ и ϕ е линейно уравнение отъ първа степенъ, т. е. че

$$\phi = a + b\xi \text{ при всъщко } i$$

(а и b , разбира се, се приемат тукъ за постоянни) — тогава може лесно да се докаже, че емпиричното приближение на величината H е, за този случай, равна на абсолютната величина на емпиричния коефициент на корелацията (gl. форм. 1 и 3)

$$H = |\tau_{12}|$$

Вертикалните черти около τ_{12} означават, че тази величина се взема съ знакъ +. Впрочемъ, знакът + или — на самия коефициентъ на корелацията зависи само отъ знака на параметра b . Доказателството на справедливостта на нашата формула е дадено тоже въ приложението къмъ настоящата статия **).

По-горе, на стр. 257, ние установихме, че при изучаването на зависимостта между интересуващите го явления, икономистът има да раз-

*) Ср. Чупровъ, I. cit. стр. 52 и 69—70; G. Darmois, Statistique mathématique, Paris 1928, стр. 198 и 214.

**) Ако във формула [12] $q_1 = 1$, тогава $H = q_2 = \sqrt{1 - \frac{\sigma_\phi^2}{\sigma_y^2}}$. Квадратътъ на този изразъ въ предъдъла си съвпада съ математическото очакване на квадрата на емпирическия коефициентъ на корелацията въ формата му, дадена, напр., у Милса (ср. F. C. Mills, Statistical Methods Applied to Economics and Business, New York, 1924, стр. 373). $E\tau_{12}^2 = 1 - \frac{S_y^2}{\sigma_y^2}$. Мисълъ, изглежда, не предвижда възможността за съществуването на компонентата q_1 .