

през периода 1925—1929 год., по месеци, по възрастни групи и причини на смъртта (народна номенклатура)

mois et par groupes d'âge, d'après les causes de décès (d'après la nomenclature internationale abrégée)

Résultats préliminaires

Maladies ayant causé la mort

Dr. заболявания на дихателната система (съвключ. на туберкулозата) — Autres affections de l'appareil respiratoire (Phtisie exceptée)	Болести на стомаха (съвключ. на рака) Affections de l'estomac (Cancer excepté)	Диария и ентерити (у деца по-малки отъ 2 год.) — Diarrhée et entérite (au-dessous de deux ans)	Диария и ентерити (у 2 години и по-възрастни) — Diarrhée et entérite (deux ans et au-dessus)	Appendicite et Typhlite	Кила, чревна задръстване — Hernie, obstruction intestinale	Cirrhose на черния дробъ — Cirrhose du foie	Остър или хроничен нефрит — Néphrite aiguë ou chronique	Незлокач. карастъци и др. болести на половитъ органи у жената — Tumeurs non cancéreuses et autres affections des organes génitaux de la femme	Родила треска — Septicémie puerpérale (Fièvre, Périlonite puerpérales)	Други нещастни случаи при бременостъ и раждането — Autres accidents puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement	Вродена слабост и вродени тълесни недостатъци — Débilité congénitale et vices de conformation	Старостно изтощение — Sénilité	Насилна смъртъ (съвключенне на самоубийство) — Morts violentes (Suicide excepté)	Самоубийство — Suicide	Други болести — Autres maladies	Неопределени или лошо определени болести — Maladies non spécifiées ou mal définies	Всичко умрѣли — Total des décédés
23	24	25	25 bis	26	27	28	29	30	31	34	33	34	35	36	37	38	

Mois  
et  
groupes  
d'âges

Pour 100 des décedés

10.7	8.5	2.9	4.9	7.9	6.7	8.0	9.9	5.9	11.1	7.0	9.7	11.6	6.2	5.7	9.0	9.9	9.4	Janvier
12.2	7.3	2.8	5.3	7.9	5.7	10.7	10.1	5.9	11.1	14.0	10.4	11.8	6.7	6.8	9.1	10.1	10.1	Février
13.9	8.5	2.7	4.9	6.6	8.5	9.3	9.8	11.8	9.7	8.0	10.9	11.6	7.7	9.1	9.8	10.5	10.2	Mars
13.1	9.8	3.4	4.9	6.6	7.5	8.0	9.1	11.8	9.7	6.0	9.5	8.5	13.1	10.8	9.3	9.6	9.7	Avril
7.8	6.1	3.4	4.0	7.9	8.5	8.0	9.3	5.9	8.3	6.0	7.7	7.2	9.4	13.6	8.2	6.8	7.9	Mai
5.5	7.3	5.3	4.8	10.5	8.5	5.3	7.8	11.8	5.6	6.0	7.4	5.7	8.2	9.7	7.4	5.9	6.7	Juin
4.9	6.1	17.5	11.0	10.5	9.4	8.0	6.2	11.8	9.7	8.0	7.4	5.8	8.8	10.8	6.9	8.8	7.6	Juillet
4.1	8.5	22.3	16.7	9.2	8.5	8.0	6.0	5.9	7.0	7.0	7.6	6.3	9.2	7.9	8.1	7.9	8.0	Roût
4.7	8.5	16.9	15.4	10.5	9.4	8.0	7.5	5.9	5.6	9.0	7.3	6.6	7.7	6.8	7.4	6.6	7.3	Septembre
6.2	11.0	10.5	12.3	7.9	11.3	8.0	7.0	5.8	5.6	8.0	6.8	7.1	8.1	5.7	8.0	6.8	7.3	Octobre
6.7	8.6	7.6	8.8	5.3	5.6	8.0	8.0	11.7	9.7	9.0	7.8	7.3	7.3	6.8	7.9	8.3	7.2	Novembre
10.2	9.8	4.7	7.0	9.2	10.4	10.7	9.3	5.8	6.9	12.0	7.5	10.5	7.6	6.3	8.9	8.8	8.6	Décembre
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Total
46.6	1.2	65.5	—	—	8.5	1.3	1.0	—	—	—	99.4	—	4.1	—	29.9	42.8	22.6	Moins de 1 an
26.0	—	34.5	50.4	2.6	4.7	—	7.0	—	—	—	0.5	—	12.0	—	5.5	13.2	12.3	1—4 ans
2.5	—	—	6.1	5.3	1.9	—	3.1	—	—	—	0.1	—	4.3	—	2.3	2.4	2.4	5—9 „
0.5	—	—	1.3	7.9	1.9	—	1.5	—	—	—	—	—	3.6	0.5	2.1	0.9	1.5	10—14 „
0.8	2.4	—	0.9	13.2	1.9	—	2.8	5.9	8.3	5.0	—	—	7.5	12.5	3.0	2.0	3.9	15—19 „
1.5	7.3	—	1.8	26.3	3.8	4.0	7.0	23.5	50.0	42.0	—	—	21.9	30.1	6.3	5.0	8.1	20—29 „
1.6	11.0	—	2.2	18.4	7.5	5.3	7.2	29.4	30.6	42.0	—	—	14.9	15.3	7.0	4.8	5.7	30—39 „
2.3	18.3	—	2.6	10.5	15.1	13.3	10.9	23.5	11.1	11.0	—	—	11.2	13.1	8.5	3.9	5.9	40—49 „
3.8	23.2	—	5.7	7.9	15.1	29.4	17.1	5.9	—	—	—	—	8.4	13.1	10.3	7.4	7.4	50—59 „
6.7	20.7	—	11.0	4.0	20.7	29.4	21.2	5.9	—	—	—	—	8.7	6.7	9.1	11.1	8.8	60—69 „
7.7	15.9	—	18.0	3.9	18.9	17.3	21.2	5.9	—	—	—	—	91.3	5.4	6.3	14.0	8.8	70 et plus
100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	Total

\*) Villes où le service du contrôle des décès et l'indication du diagnostic médical sont faits par des médecins.

предѣлението на всички умирация по възраст, се намира, също така, голѣмо относително число, което показва умирацията на лицата на възраст надъ 70 години. Отъ същия статистически редъ се вижда, че относителния брой на умирацията е най-голѣмъ въ първитъ две най-низки възрасти, а именно—до 1 год. и отъ 1 до 4, следъ което идватъ напредналитъ възрасти 60—69 и надъ 70 години. Срѣдно мѣсто заематъ относителнитъ числа за възрастьта отъ 20—29 години. Сравнително съ най-малкъ брой умирация се отличава възрастта отъ 10 до 14 години.

Общото впечатление отъ прегледа на тая таблица е, че за всѣка възраст действително

съществува съответна присъща проява на отдѣлнитъ видове болести. Наредъ съ това и всѣка болестъ различно се проявява при отдѣлнитъ възрастни групи. Относителнитъ числа, вписани въ таблица 2, потвърждаватъ това. Така, напр., отъ същитъ числа ясно се вижда, че туберкулозата, въ различие отъ много други болести, покосява извънредно чувствително индивидитъ на най-дейнитъ възрасти. На всѣки 100 умрѣли лица отъ тая болестъ 25.9 сж на възраст отъ 20—29 години, 13.7— на възраст отъ 15 до 19 години и 13.7 отъ 30 до 39 години, или изобщо отъ 15 до 40 годишна възраст, ще рече тъкмо презъ най-трудоспособнитъ години, умираатъ 53.3% отъ всички умрѣли отъ туберкулоза.