

Въ противовесъ на туберкулозата, болеститѣ брусница, скарлатина, дифтеритъ и коклюшъ поразяватъ почти изключително само индивиди отъ най-низкитѣ възрасти. Относителнитѣ числа на загубитѣ, причинени отъ брусница, свидетелствуватъ, че 89·8% произхождатъ отъ деца до 4 години, а 8·5 отъ такива на 5 до 9 години. Почти сжщото нѣщо се забелязва и при скарлатината: 83·7% на причинената отъ нея загуба се дължатъ на деца до 9 годишна възраст. Съответниятъ процентъ отъ коклюша е 100%, а отъ дифтерита 94·8%.

Менингита (§ 17) сжщо така се проявява най-много при началнитѣ възрасти до 1 година и отъ 1—4 години.

Острия бронхитъ (§ 20) взема жертвитѣ си тоже изключително отъ ранната възраст. Процентътъ отъ него до 1 година е 71·9, а отъ 1—4 год. 23·4.

Индивидитѣ съ напреднала възраст се поразяватъ главно отъ мозъчно кръвоизлияние, размекване на мозъка (§ 18) и старческо изтощение (§ 34).

Други болести, които сжщо така засѣгатъ по-напредналитѣ възрасти, сж рака и други

РАЗПРЕДЕДЕНИЕ НА УМИРАНИЯТА ПО ВЪЗРАСТЪ И ПРИЧИНИ НА СМЪРТЬТА ПРЕЗЪ 1929 ГОД. ВЪ 93 ГРАДА НА ЦАРСТВОТО  
 RÉPARTITION DES DÉCÈS D'APRÈS L'ÂGE ET LES CAUSES DE DÉCÈS EN 1929 DANS 93 VILLES DU ROYAUME

