

постоянни във времето, с колебания в много тесни граници и без ясно изразена тенденция на изменение. За интервала 70-79 г. се установява, че стойностите на отношението в началото на периода са най-големи. От 1988 г. обаче се очертава ясно изразена тенденция на намаление, което е признак за доближаване равнището на смъртността в интервала 70-79 г. до това в интервала 60-69 години. И докато стойностите за следващия интервал - 80-89 г. от 1988 г. започват леко да нарастват, то при последния възрастов интервал се констатират само слаби колебания в началото и края на периода (табл. 2).

Таблица 3

ПОВЪЗРАСТОВИ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА СМЪРТНОСТ НА МЪЖЕТЕ И ОТНОШЕНИЯТА
ИМ МЕЖДУ ДВА СЪСЕДНИ ВЪЗРАСТОВИ ИНТЕРВАЛА В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ ПЕРИОДА 1985 - 1993 ГОДИНА

(‰)

Възраст (години)	Години								
	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
1 - 9	0,75	0,63	0,79	0,86	0,76	0,74	0,78	0,83	0,70
10 - 19	0,70	0,65	0,77	0,68	0,72	0,79	0,74	0,69	0,72
20 - 29	1,43	1,33	1,35	1,36	1,41	1,53	1,39	1,55	1,47
30 - 39	2,47	2,38	2,28	2,50	2,58	2,60	2,53	2,64	2,92
40 - 49	5,70	5,61	5,37	5,49	6,10	6,12	5,81	6,58	6,84
50 - 59	13,67	13,68	13,63	14,09	14,61	14,54	14,24	15,30	16,10
60 - 69	28,79	28,27	28,94	30,60	31,32	31,45	32,17	31,57	31,74
70 - 79	78,78	78,76	82,27	79,33	73,57	73,77	70,86	66,94	66,86
80 - 89	173,00	156,30	171,48	165,08	161,84	163,95	167,17	162,92	157,17
90+	389,95	357,44	352,32	350,26	366,95	365,92	370,63	313,90	250,56
Отношения									
10-19/1-9	0,9	1,0	1,0	0,8	0,9	1,1	0,9	0,8	1,0
20-29/10-19	2,1	2,0	1,7	2,0	2,0	2,0	1,9	2,2	2,0
30-39/20-29	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	2,0
40-49/30-39	2,3	2,4	2,4	2,2	2,4	2,4	2,3	2,5	2,3
50-59/40-49	2,4	2,4	2,5	2,6	2,4	2,4	2,5	2,3	2,4
60-69/50-59	2,1	2,1	2,1	2,2	2,1	2,2	2,3	2,1	2,0
70-79/60-69	2,7	2,8	2,8	2,6	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1
80-89/70-79	2,2	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,4	2,4	2,4
90+ /80-89	2,3	2,3	2,1	2,1	2,3	2,2	2,2	1,9	1,6

Анализът на повъзрастовата смъртност при мъжете от първите три възрастови интервала (1-9, 10-19 и 20-29 г.) показва, че най-ниско равнище е достигнато