

4. Трябва да се има предвид, че все пак приложеният метод е приблизителен и резултатите трябва да се приемат като приблизителни.

5. За получаване на точни резултати е необходимо да се направи регистрация на умрелите по възраст и етническа принадлежност. Някои възможности в това отношение е добавянето на подходящи въпроси при преброяванията на населението (каквато е практиката в други страни и е най-удобно за поставената цел), задаването на такива въпроси при извършването на редовни представителни статистически наблюдения с достатъчно голям обем на извадката (например това за изучаването на заетостта и безработицата) или специално организирани за тази цел и др.

6. За изравняване на средната продължителност на предстоящия живот, а също и за нейното повишаване като цяло, е необходимо държавната политика да бъде насочена към предотвратяване на преждевременната смърт - особено поради външни причини (пътнотранспортни произшествия, трудови злополуки, криминални деяния и т.н.), намаляване на забременяванията в ранна възраст - особено при ромския етнос, подобряване на здравеопазването - и особено на профилактиката, подобряване на условията на живот и т.н.

Приета за печат на 7.02.2008 г.

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА:

- Венецкий, И. Г.** (1971). Математические методы в демографии, Статистика, Москва.
- Brass W. et al** (1968). The Demography of Tropical Africa. Princeton: Princeton University Press.
- Bennett, N. G., S. Horiuchi** (1984). Mortality estimation from registered deaths in less developed countries, Demography. 21(2): 217-234.
- United Nations** (1983). Brass growth balance method. In: United Nations, Manual X. Indirect Techniques for Demographic Estimation, New York: United Nations.